



# Capoten

CAPTORIL

طفالك وأمراض القلب

[www.aubmc.org](http://www.aubmc.org)



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER  
المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت

كان السلاح محتكر

الجامعة الأمريكية في بيروت  
المركز الطبي  
صندوق البريد: ٢٣٦-١١  
رياض الصلح، بيروت ١٠٧٣٠٢  
بيروت - لبنان

# ما هو هذا الدواء؟

## ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من 4 ساعات، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والانتقاء بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من 4 ساعات، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن.  
لا تعطِ أبداً جرعة مضاعفة.

## عوارض جانبية محتملة:

- دوخة خفيفة
- سعال
- فقدان مؤقت لحسنة الذوق
- فقدان الشهية

## إتصل بالطبيب فوراً إذا اشتكى الطفل من:

- عوارض الحساسية للدواء وهي طفح جلدي، وصعوبة في التنفس، وتورّم الوجه أو اللسان.

## إرشادات عامة:

- آخرض على إعطاء طفلك كمية كافية من السوائل إذ يزيد الدواء من احتمال إصابة الطفل بالجفاف.

أخبر الطبيب إذا كان الطفل يعاني من:

- حساسية ضدّ أي دواء آخر.
  - أمراض في الكلى ومرض السكري.
- إلتزم دوماً بتعليمات الطبيب.

هو دواء من مجموعة "ACEI" «مثبطات أئية سي» يعمل على تحسين عمل عضلة القلب وتحسين تدفق الدم وعلاج الضغط العالي.

## كيفية الاستخدام:

يؤخذ عن طريق الفم ساعة قبل الطعام أو ساعتين بعد الطعام.  
الدواء متوفّر في الأشكال التالية:

- شراب 1 mg/ml

يمكن أن يحضر في صيدلية الجامعة الأميركيّة أو في صيدليات أخرى.



يستعمل المكيال الخاص لإعطاء الدواء ولا تستعمل ملعقة الطعام العاديّة.  
إلتزم دوماً بالجرعة المعطاة من قبل الطبيب.

- حبة 25 mg
- حبة 50 mg



يمكن تذويب الحبة في الماء وإعطاؤها حسب التعليمات المعطاة.

## دواعي الإستعمال:

- قصور القلب الاحتقاني
- ارتفاع ضغط الدم