

Coumadin

WARFARIN

طفلك وأمراض القلب

www.aubmc.org



AMERICAN UNIVERSITY of BEIRUT MEDICAL CENTER
المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت

كلنا سلامة صحتكم

ما هو هذا الدواء؟

هو دواء يساعد على الحدّ من تكوين جلطات الدم عن طريق منع تجميع عوامل تخثر معينة.

كيفية الاستخدام:

يؤخذ عن طريق الفم.

الدواء متوفر في الأشكال التالية:

- حبة 5 mg (للتحويل من Sintrom إلى Coumadin،
أضرب جرعة الـ Sintrom بـ 1.85).

عوارض جانبية محتملة:

- غثيان أو قيء
- ألم في المعدة
- تساقط الشعر

إتصل بالطبيب فوراً إذا اشتكى الطفل من:

- دم في البول أو في السعال أو القيء.
- براز أسود.
- تلون في أي مكان في الجسم.
- عوارض الحساسية للدواء وهي: طفح جلدي، صعوبة في التنفس، تورم في الوجه واللسان.

إرشادات عامة:

- هذا الدواء يزيد من احتمال حدوث نزيف، لذا إحرص على تجنب طفلك الجروح والإصابات، وتأكد من استعماله فرشاة أسنان لينة.
- أخبر طبيب الأسنان أو أي طبيب آخر يعالج طفلك أنه يتناول هذا الدواء.
- سيطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دورية PT/INR للتأكد من فعالية الدواء. إلتزم دوماً بمواعيد هذه الفحوصات.

أخبر الطبيب إذا كان الطفل:

- يعاني من أمراض في الدم أو الكبد.
- قد أجرى عملية جراحية حديثة للعين أو الدماغ.
- يعاني من حساسية ضدّ أي دواء آخر.
- يتناول أدوية أخرى.
- بحاجة إلى عملية جراحية لكي يرشد الطبيب كيفية توقيف الدواء.

ماذا تفعل في حال نسيت إعطاء الجرعة:

- إذا كان وقت الجرعة التالية بعد أقل من ١٢ ساعة، يجب عدم إعطاء الطفل جرعة إضافية والاكْتفاء بالجرعة القادمة. أما إذا كان الوقت الفاصل أكثر من ١٢ ساعة، فيجب إعطاء طفلك الجرعة الناقصة في أقرب وقت ممكن. لا تعط أبداً جرعة إضافية.

دواعي الإستعمال:

- الحدّ من خطر التعرّض لجلطات الدم